

D E  
SECUNDINARUM AB UTERO  
EXPULSIONE.  
*DISSERTATIO*  
ANATOMICO-CHIRURGICA.

*HANC DISSERTATIONEM, DEO JUVANTE, & Præfide  
M. PETRO-FRANCISCO GALLÉE, Artium liberalium & Chi-  
rurgiae Magistro, saluberrimæ Facultatis Medicinæ Andegavensis  
Doctore Medico; tueri conabitur JOANNES-RAYMUNDUS  
ECLANCHER, Petrocoricensis, præclaræ Artium Facultatis  
in almâ Universitate Parisiensi Magister, in Scholis Regiæ  
Præctis, necnon in Nosocomio vulgò dicto la Salpêtrière, olim  
Alumnus, Theseos Auctor.*

*Die Sabbati, 5<sup>a</sup> mensis Augusti, anno R. S. H. 1786, à sesqui-  
secundâ post meridiem ad septimam.*

P A R I S I I S,  
IN REGIIS CHIRURGORUM SCHOLIS.  
PRO ACTU PUBLICO,  
ET  
MAGISTERII LAUREA.



Typis MICHAELIS LAMBERT, Regii Chirurgiæ  
- Collegii, necnon Academiæ Typographi, viâ Cytharæâ.

---

M. DCC. LXXXVI.











*D E*  
SECUNDINARUM AB UTERO  
EXPULSIONE.  
*D I S S E R T A T I O*  
ANATOMICO-CHIRURGICA.

---

**E**FFLUXERUNT Amnii aquæ ; in lucem editur fœtus , re-  
fecatur funiculus umbilicalis , viget puerpera : nondùm adim-  
pletur Naturæ votum ; debent etiam eliminari secundinæ : quo-  
nam verò tempore , quonam modo , in dissertatione discepra-  
turi sumus. Ut autem res clariùs illucescat , pauca de Anatomîâ  
præmittere operæ pretium est.



**V**iscus cavum, vesicam urinariam inter & intestinum rectum, quibus laxè adhæret, regione in hypogastricâ situm, excipiendo fœtui dictum, Uterum vocant Anatomici. Ipsius pars superior & amplior, fundus dicitur; cuius è lateribus duo canales exeunt, tubarum *Fallopii* nomine insigniti, ad parva corpora oblonga, quæ ovaria nominantur, tendentes; pars media corpus appellatur; inferior seu cervix rimâ transversâ tumidis labiis comprehensâ, aperitur, ob formamque os tincæ vocatur; in parturientibus autem magno donatur orificio circulari, mucò abundanti obfito, intrâ vaginæ parietes quibus annectitur, aperto.

UTERI cavitas quandoque bipartita, plurimis est pertusa poris vasorumque ostiis, lympham sanguinemve, pro circumstantiis, stillantibus; in illa quoque tubarum *Fallopii* collique orificia interna patent.

MEMBRANAM exteriorem utero præstat peritonæum, cuius variæ reflexiones, duo ligamenta lata, quæ tubas *Fallopii*, uterumque lateraliter amplexuntur, efformant; rotunda etiam duo alia sunt, quæ è fundo uteri exoriuntur, & per annulum musculi obliqui majoris exitum sibi parant, & in adipe evanescunt. Interiorem verò membranam, villosam, flocculentam ipsi præbet epidermis.

HUJUS visceris fabricæ intimæ accedunt vasa lymphatica, nervosa, sanguinea, & sinus, quorum tantus est diameter versùs gestationis finem, ut digiti extremitatem facillè admittere possent: accedunt etiam tela cellulosa, in gravidis laxa, in vacuis densè stipata, fibræque musculares attendenti apparentes, quarum magna pars à fundo uteri ad collum extenditur; sunt tamen obliquæ, transversæ, decussatæque aliæ, & in circellos imprimis in fundo dispositæ.

PLACENTA, funis umbilicalis, chorion & amnios continentur utero gravido; hæ partes secundinarum nomine designantur, ex eo quòd secundo partu ut plurimùm excernantur.



**PLACENTA** corpus est spongiosum, orbiculare, uteri funde, inter chorii duplicaturam, sæpè-sæpiùs hærens, vasis sanguineis, venosis & arteriosis cum textu celluloso intertextis, constans, duabusque faciebus; convexa una, quæ chorii laminâ obducitur, quæque superficiei internæ uteri, mediantibus lobulis numero indefinitis, sinus uterinæ substantiæ ingredientibus, humoremque lymphaticum exfugentibus, adhærescit; concava altera, inæqualis, fœtum ipsiusque alia involucra spectans: hanc super omnia placentiæ vasa in tres truncos ingentes coeunt, binas arterias umbilicales dictas, venamque ejusdem nominis, constituentes, ex quarum unione funiculus, umbilicalis nomine notus, exurgit, semi-ulnam circiter longus, varios in gyros plicatus, cellulosa telâ & membranâ quæ amnio continuatur circumdatus: fœtus umbilicum subit, tuncque in sinum venæ-portarum abit vena; arteriæ verò in primarias iliacarum divisiones inferuntur.

**MEMBRANÆ** duæ fœtum ipsiusque aquas involvunt; exterior una, interior altera: prima villosa, vasculosa, porosa, internam uteri substantiam duasque placentiæ facies immediatè regit, hisque satis firmiter conglutinatur; chorion dicitur: secunda, tunica tenuis, pellucens, vix vasculosa, priori subjicitur & cohæret; aquæ quibus innatat fœtus eam undiquè alluunt: amnios audit.

**VASA** sanguinea uterum omniaque fœtus involucra dædaleis distributionibus irrorantia, & inter se communicantia, ab umbilicalibus, hypogastricis & spermaticis oriuntur.

Hæc de Anatomiâ satis sunt, ut clarè constet maxima oriri mala, si tempore debito non extrahantur secundinæ, quæ ab auctoribus aliundè fusè descriptæ sunt: iis itaque examinandis hîc longius inhære supervacuum.

MULTUM inter auctores & practicos, utrùm secundinæ statim ac fœtus ab utero exclusus fuerit, sint avellendæ nec-ne, disputatum est: variant opiniones; suam quisque ruerur: nostram



quoque exponemus. Si rem non enodaverimus, litem tantisper componere conabimur. Qui de citâ secundinarum avulsione cogitant, iis nostrum non præbemus assensum; ista enim operatio maximam puerperæ inferre potest noxam: tunc reipsâ temporis non maximè coarctantur uterinorum vasorum orificia; lobuli placentæ de uteri sinibus nondùm exeunt, his adhuc plus minusvè firmè adhærent, flocculi chorii utero adhuc connectuntur, ex quibus omnibus certum imminere periculum vel præsens vel futurum, si in secundinis extrahendis tam inconsiderata praxis admitteretur, nobis colligere liceat; dum enim nondùm solutam placentam protrahere tentant, sive illud fiat funiculum umbilicalem attrahendo, sive immisâ in uterum hiantem imprudenti manu, fieri non potest quin uterus trahatur, irriterur, lædaturve: proindè nil mirum si sanguinis insigne profluvium ex patulis vel abruptis vasis, vitam mulieris in discrimen quandoque adducens, veniat; nil mirum si invertatur uterus, eò periculosior inversio, quò fuit improvisior: tunc reipsâ stupent omnes, stupet & ipse persæpè obstetricans; jugiter distillat sanguis; incassum implorat opem puerpera; deficient vires, crebra patitur animi deliquia; aurium tinnitus, sudores frigidi superveniunt, vitæque cum sanguine fugit. Fatendum tamen tam funestâ eam semper non corripî hæmorrhagiâ; non negandum etiam quandoque se coarctare uteri inversi orificium, partemque inversam stringere; undè, nisi statim reponi possit hæc pars prolapsa, opus arduum, citò inflammatur & in gangrænâ abit; ex hisque istam inversionem nunquam esse periculi immunem, concludendum. Et ut convulsiones uterique prolapsus taceamus, quid de vulneribus, inflammationibus hanc per praxim præproperam substantiæ uteri inflictis, dicemus? Sanane ex illis semper abierit mulier? nonne, minimâ occasione datâ, ulceribus, polypis, scirrhis, &c. ansam præbebunt? nonne anguis in floribus latens, undè



5  
sapissimè causa non praesensa tot morborum foeminas ociùs  
seriùsve tam miserè excruciantium ?

Cum tanta hanc-*ce* methodum comitentur consecreturve  
accidentia , aliam mitiorem , tutiorem , horumque malorum  
immunem investigandam esse , nemo inficias ibit ; quod pensum  
nostrum est , hocque pro viribus nostris absolvemus . Si igitur  
parturientibus auxiliatricem manum porrigere cupias , quid arti  
negatum sit , quid ei tribuendum circumspicias : nimum festi-  
nantem praxim apage , Naturæque molimen fidenter speres :  
illâ duce obstetricans agat , nec turbet imprudens , nec molietur  
adversâ : si manu juvari velit , ad eandem salutis metam nisu  
reciproco tendant , amicè conspirent , unâ debellant ; felix  
indè & certior sese manifestabit effectus . His imbutus præceptis ,  
simul ac in lucem prodierit foetus , abortivus vel non ; funem  
umbilicalem reseca ; ex parte infantis eum alliges vel non , prout  
debilis , fortis , plethoricusve fuerit ; ex parte verò matris , non  
tantum superfluum , sed & noxiam fore ligaturam judicamus :  
liber igitur relinquendus , ut facile fluat sanguis in placentâ con-  
tentus , hæcque minus acquirat volumen , faciliùsque idcirco  
foràs amandetur ; nec tamen idèd nocivam puerperæ hæmor-  
rhagiam ex ea funiculi abscissi parte quæ à placentâ penderet  
& non deligatur , pertimescas : variis enim experimentis ab auc-  
toribus & à nobis summâ curâ institutis , constat , eam tantum  
modò sanguinis quantitatem effundi , quæ in placentâ dum adhuc  
ei adhærebat infans , collecta erat ; sexcentis aliundè demonstratur  
argumentis nullam sanguinis circulationem , gravidam inter  
& secundinas , dum foetus in utero jacet , existere ; à fortiori , si  
jam aliqua fibrarum uterinarum contractio supervenerit : reli-  
quum negotium Naturæ committendum est , & ab utero sponta-  
neam secundinarum expulsionem expectare ne dubites ; simul atque  
enim suis è claustris erupit infans , vi fibrarum musculosarum se-



contrahit variâ cum celeritate, pro circumstantiis puerperæque idiosyncrasiâ, uterus ultra modum adhuc distentus: fit densior; ipsius vasa arctantur, ipso facto minus adhæret placenta, brevi-que temporis spatio omninò solvitur, fit corpus extraneum actionem uteri perpetuò sollicitans, se contrahunt fibræ ut ab onere se liberent, magis ac magis comprimitur placenta, donec tandem ipsa & accessiones expellantur: tum vasa in minus lumen nitent, ad volumen propemodùm naturale sensim sine sensu redit uterus, heterogenea exprimit & evacuat, placidè fluunt lochia, omniaque ex Naturæ voto prosperè succedunt. Tunc mente quietâ consistas; quorundam auctororum practycorumque de miasmatum putridorum resorptione, de cervicis uteri constrictione expulsionì placentæ adversâ, futilia dicta procul rejicias: quin imò, etiamsi constringeretur collum fœtu extracto, quod reverâ haud rarò in validis sanisque mulieribus contingit, quid inde colligendum foret, nisi quòd ad eliminandas secundinas quibus perdifficilis tunc pateret exitus, cunctandum sit, cum certâ comprobetur experienciâ alterno motu agere uterinas fibras, uterique orificio sese angustante, laxari fundum; collumque à fundi uteri contractionibus, quin priùs à secundinis aliisque heterogeneis fuerit vacuus, non quiescentis, relaxari & diduci? Ambigis adhuc in dubioque obstinatè hæres? primarum parentum historiam in memoriam revoces: in animalia ipsa, in multas pauperulas mulieres, in plurimas militum uxores, in meretrices; uno verbo, in omnes solis Naturæ viribus parturientes, oculos conjicias; nonne tamen efficaci nec turbulento nisu secundinas, adversarios malignosve humores sponte expellit naturalis uteri contractio? nonne tamen fruuntur valetudine periculosioribus & exitialibus malis suprà memoratis rarò obnoxii? Hoc certè tibi erit solatio, si præsertim attenderis hanc methodum esse generalem, admittendamque in illis casibus



tantum, ubi nullum subest periculum, ubi satis viribus instructa deprehenditur parturiens; quod ex præteritis & præsentibus facile noscitur, vigente adhuc utero & ad contractionem pronò, quam nullo labore percipies, si manum hypogastricæ regioni admoveas; tunc enim durissimum globum quem efformat se contrahens uterus, per integumenta senties; vel si digitum in uteri collum immittas, cujus fibrarum actio ipsam & uteri indicabit.

Ex dictis patet musculorum parturientis actionem solam semper sufficere non posse ad removendas ex utero secundinas; imò & etiam periculosam maximè, mortiferamve fore res ipsa docet, nisi quibusdam in casibus, de quibus unum aut alterum verbum dicemus, illi ars opitularetur.

QUANDOQUE exclusionem fœtus sequitur hæmorrhagia uterina ineluctabilis, sive planè avellatur placenta, seu ex parte tantum, sive sanguinis rivus, ex eo quòd super orificii matricis circumferentiam agglutinata hæreat placenta, oriatur, pro causave uteri fibrarum atoniam agnoscat; quod non rarum in debilibus imprimis molliterque educatis mulieribus toto graviditatis tempore inerti torpentibus orio; de hacque certus eris, si durissimum globum, de quo suprà, non sentias; si è contrà abdomen flaccidum, non resistens, collumque uteri amplum, hians, nullaque actione donatum, deprehendas: in his hæmorrhagiarum generibus, quidquid sit de causâ, secundinarum expulsio solis Naturæ viribus non est committenda: uterus enim repetitis contractionibus quarum ope fœtum exclusit, sanguinisque effluvio jam debilitatus, eò ad actionem evaderet imbecillior, quòd vasorum ostia ad reactionem minimè apta, sanguinem undatim effunderent, quod fieri non posset quin magis-ac-magis debilitaretur uterus, & quàm brevi temporis intervallo parturientis anima, cum sanguine & viribus evola-



ret in auras , citissimum nisi adhiberet remedium in arte obstetriciâ peritus : ille tanta sæpissimè præcavet mala , corrigit nascentia reparatque extrema , nec remediis immoratur internis ; tam imbellibus phaleratus armis , si malum adoriretur , victor non recederet. Malo urgente , urget auxilium ; nec mora : quibusdam topicis adstringentibus & frigidis , variisque irritationibus internis incassum prius adhibitis , ad ultimam salutis anchoram tendit , chordam umbilicalem sinistrâ manu linteo sicco munitâ apprehendit & attrahit , dextrâque manûs digitis in vaginam immittit , uteri collum irritat , funemque tensum dirigit ad locum insertionis placentæ & ad angulum quem axis uteri cum vaginæ axi efformat , probè attendendo , lenibusque moribus quaquaversum secundinas extrahere conatur ; quæ si nimiam afferant resistantiam ( non raram , si præsertim cum utero , ut aiunt auctores , conferruminantur , vel in peculiari quasi sacco ob inæqualem uteri contractionem incarcerationentur , vel si excluso fœtu convulsionem superveniant ) à tractione desistit , statimque oculatam manum in cavum uteri immittit ; quâ mediante , uterinarum fibrarum actionem , pro re natâ , sollicitat : idem faciendum , si abrupta fuisset chorda umbilicalis , digitisque placentam inter & uteri substantiam blandè collocatis , hujus cum istâ nexum , si quis adest , placidè prudenterque solvit ; quo peracto , faventibus agræ reviviscentis nixibus , secundinas attrahit , harumque si fortè remanerent in utero particulae , nimio hunc mundandi studio , substantiam ipsius internam , pertractationibus intempestivis , non malè afficeret ; à Naturâ verò illarum expulsionem spontaneam fidenter expectaret.

POSSENT hæc auctoritatibus fulciri , ulterius deduci , explanari , & dictis plurima addi : nostræ verò dissertationis limites ne ultra progrediamur verant. Quæ supersunt dicenda , disceptationibus dilucidabuntur.



Hujus disquisitionis conclusio per se facillè patet ; Naturæ scilicet motus & uteri contractiones ferè semper solas sufficere ad removendas ex utero secundinas ; in hâcque assertionem nec accusanda præjudicata opinio , nec quid pertimescendum , ubi ratio & experientia in unum conspirant.





THE  
LIBRARY OF THE  
MUSEUM OF NATURAL HISTORY  
AND  
ZOOLOGY  
OF THE  
CITY OF LONDON

